



Provtagning för undersökning om det finns spår av blod i avföringen, Feces-Hemoglobin




Förberedelser

Normalt tas sammanlagt 3 prover från 3 olika dagar men ibland ordineras färre prover. Det är viktigt att provtagning inte sker under menstruation, vid blödande hemorrojder eller blod i urinen.

Du behöver: namnetiketter och tre speciella provtagningsburkar för avföringsprov som du får av din vårdgivare.

Gör så här

1. Märk provtagningsburkarna med personnummer, namn och provtagningsdatum. Använd medföljande namnetikett om sådan finns.
2. Lämna avföring på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.
3. **Bild 1** - Öppna provtagningsburken, som innehåller vätska. Ta avföringsprov med provtagningspinnen som sitter i locket. Stick ned och rotera pinnen på olika ställen i avföringen tills ändens båda fåror är fyllda. Avlägsna överskott genom att försiktigt torka av pinnen med toalettpapper.
4. **Bild 2** – Rätt mängd avföringsprov är den som ryms i de båda fårorna i pinnens ände. Skruva på locket så att det sluter tätt.
5. **Bild 3** - Skaka burken tills avföringen har lösts upp i vätskan.
6. Ange korrekt provtagningstid (datum och klockslag) på burken.
7. Dag 2 gör likadant med den andra burken och dag 3 den tredje burken.
8. Lämna in proverna på din vårdenheter eller en vårdcentrals laboratorium snarast, dock senast inom 6 dagar efter den första provtagningen. Provtagningsburkar med avföring förvaras i kylskåp (rekommenderas) eller i rumstemperatur.



OBS! Vätskan i provtagningsburken får inte förtäras, inte hällas ut och inte heller spädas om den spillts ut. Hämta ny provtagningsburk om det blir fel.