



AKADEMISKA SJUKHUSET

Resultat Ryggmärgsskador 2018 Rehabiliteringsmedicin

En ryggmärgsskada, som uppstår i vuxen ålder, kan orsakas av trauma mot ryggen eller ryggmärgen. De vanligaste skadeorsakerna i Sverige är fall och trafikolyckor. Andra orsaker kan vara förslitningar i kotpelaren, blödningar eller syrebrist, infektioner, andra inflammationer och tumörer.

En ryggmärgsskada kan leda till många olika symptom. Några av de vanligaste symptomen är förlamningar och/eller känselstörningar i benen och/eller armarna, ökad muskeltonus, svårigheter att kontrollera urinen och avföringen, smärta samt blodtrycksfall.


Resultaten är hämtade från kvalitetsregistret WebRehab.

Antal patienter i
slutenvård



48

Antal som upplevde sig
delaktiga i
rehabiliteringen



97,4%

Skulle rekommendera
rehabiliteringen till
någon annan

Kön



28 20

Medelålder: **54 år**
(Spridning 22-79 år)

Utskrivning till egen
bostad



85%

Medelvårdtid: **39 dygn**
(Spridning 4 - 144 dagar)

Patienternas självständighet ökade under
rehabiliteringen

