

Smittsam magsjuka sjukvård

	Påstående	Sant	Falskt
1.	Redan vid första misstanke om smittsam magsjuka ska vårdhygien kontaktas.	X	
2.	Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret		X
3	Även vid intagningsstopp ska man försöka bedriva kohortvård	X	
4	Kohortpersonal ska inte vistas i patientköket.	X	
5.	Städningen har ingen betydelse för smittspridningen		X
6.	För att insjukna måste smittämnet passera munnen	X	
7.	Vinterkräksjukan smittar via luften så alla borde bära munskydd		X
8.	Handsprit är tillräckligt för att avdöda magsjukevirus		X
9.	Ett negativt provsvar utesluter vinterkräksjukan		X
10.	Rätt mathantering på avdelningen har en avgörande betydelse för smittspridning	X	
11.	Inom kohorten måste man använda handskar och plastförkläde i alla situationer		X
12.	Det är viktigt att invänta provsvar så man inte isolerar patient i onödan		X
13.	Långärmat plastförkläde kan skydda mot stänk vid vård av patient med kräkningar och diarré	X	
14.	Personal som haft vinterkräksjukan får inte återgå i tjänst förrän efter 48 timmar efter sista symtom		X
15.	Vårdplanering kan utföras på avdelning med magsjuka	X	
16.	Munskydd kan behövas vid nära omvårdnad av patient med pågående kräkningar och diarré	X	
17.	Patient som delat toalett med magsjuk patient kan när som helst skrivas ut till hemmet	X	
18.	Patient som genomgått magsjuka kan flytta till annan vårdenheter efter 24 timmars symtomfrihet	X	