

Smittsam magsjuka sjukvård

	Påstående	Sant	Falskt
1.	Redan vid första misstanke om smittsam magsjuka ska vårdhygien kontaktas.		
2.	Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret		
3	Även vid intagningsstopp ska man försöka bedriva kohortvård		
4	Kohortpersonal ska inte vistas i patientköket.		
5.	Städningen har ingen betydelse för smittspridningen		
6.	För att insjukna måste smittämnet passera munnen		
7.	Vinterkräksjukan smittar via luften så alla borde bära munskydd		
8.	Handsprit är tillräckligt för att avdöda magsjukevirus		
9.	Ett negativt provsvar utesluter vinterkräksjukan		
10.	Rätt mathantering på avdelningen har en avgörande betydelse för smittspridning		
11.	Inom kohorten måste man använda handskar och plastförkläde i alla situationer		
12.	Det är viktigt att invänta provsvar så man inte isolerar patient i onödan		
13.	Långärmat plastförkläde kan skydda mot stänk vid vård av patient med kräkningar och diarré		
14.	Personal som haft vinterkräksjukan får inte återgå i tjänst förrän efter 48 timmar efter sista symtom		
15.	Vårdplanering kan utföras på avdelning med magsjuka		
16.	Munskydd kan behövas vid nära omvårdnad av patient med pågående kräkningar och diarré		
17.	Patient som delat toalett med magsjuk patient kan när som helst skrivas ut till hemmet		
18.	Patient som genomgått magsjuka kan flytta till annan vårdenhet efter 24 timmars symtomfrihet		