

Smittsam magsjuka Kommunal vård

	Påstående	Sant	Falskt
1.	Redan vid första misstanke om smittsam magsjuka ska vårdhygien och MAS kontaktas.		
2.	Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret		
3.	Även vid intagningsstopp ska man försöka bedriva kohortvård		
4.	Bufféserving är olämpligt vid magsjuka.		
5.	Städningen har ingen betydelse för smittspridningen		
6.	För att insjukna måste smittämnet passera munnen		
7.	Vinterkräksjukan smittar via luften så alla borde bära munskydd		
8.	Handsprit är tillräckligt för att avdöda magsjukesvirus		
9.	Ett negativt provsvar utesluter vinterkräksjukan		
10.	Rätt mathantering på enheten har en avgörande betydelse för smittspridning		
11.	Inom kohorten måste man använda handskar och plastförkläde i alla situationer		
12.	Det är viktigt att invänta provsvar så man inte isolerar vårdtagare i onödan		
13.	Långärmat plastförkläde kan skydda mot stänk vid vård av vårdtagare med kräkningar och diarré		
14.	Personal som haft vinterkräksjukan får inte återgå i tjänst förrän efter 48 timmar efter sista symtom		
15.	Personal på avdelning med magsjuka ska inte delta i vård på andra avdelningar under samma arbetspass		
16.	Munskydd kan behövas vid nära omvårdnad av vårdtagare med pågående kräkningar och diarré		
17.	Vårdtagare som delat toalett med magsjuk vårdtagare kan när som helst skrivas ut till hemmet		
18.	Vårdtagare som genomgått magsjuka kan flytta till annan vårdenheter efter 24 timmars symtomfrihet		