

Titel: Syrgas		Dokumenttyp Vårdrutin
Godkänt av: Hans Blomberg, ambulansöverläkare /	Godkänt den: 2010-02-10	
Skapat av: Johan Lingsarve, utvecklingssköterska	Skapat den: 2007-11-12	
Under rubrik: Läkemedel		
Reviderat av: Kristofer Erling, utvecklingssköterska	Reviderat den: 2015-10-14	

Bakgrund

Syrebrist, hypoxi, har en skadlig inverkan på kroppens samtliga organ. Andningsoxygen är ett läkemedel som ska ges vid hjärtstopp, medvetslöshet, drunkningstillbud, trauma och akuta sjukdomstillstånd.

Bakgrundskrav/riktlinjer

- Genomgått grundutbildning i sjukvård för IVPA
- Godkänd i årliga delegationsförfarandet
- Tagit del av detta dokument
- Tänk på att inte ha syrgas nära utrustning och i miljöer med brand eller explosionsrisk

Indikation

Syrgas på mask med reservoar 15 liter vid medvetslöshet, trauma och drunkningstillbud där patienten har egen andning. Syrgas på pocketmask 15 liter med inblåsningar vid hjärtstopp. Till barn med andningspåverkan eller andra akuta sjukdomstillstånd påbörja syrgasbehandling och kontakta ankommande ambulans för rådgivning.

Kontraindikationer

Inga, läs mer under försiktighet.

Försiktighet/observera

Patienter med lungemfysem KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom.
Patienter med KOL kan om de ges för mycket syrgas först bli slöa och efter en tid sluta

andas. Skulle en KOL patient bli slö/dåligt kontaktbar av syrgas, stäng av syrgasen och observera/utvärdera. Vid andnings/hjärtstopp arbeta enligt riktlinjer för D-HLR. Kontakta ankommande ambulans för rådgivning.