



Avföringsprov, F- *Helicobacter pylori* (antigenpåvisning)

Förberedelser

- 1 BoS-etikett (med 2 olika RID-nummer och 2 olika provtagningstider)
- 1 – 2 specifik provtagningsburk/ar, art.nr [44927](#).
Burk med en provtagningssked i locket.
- Rent engångskärl för uppsamling av feces.



Gör så här när patienten lämnat avföring:

1. Öppna provtagningsburken.
Använd provtagningsskeden som sitter i locket till att föra över feces till röret. Fyra skedar räcker normalt (prov mängden bör motsvara 4–6 ärtor) men om avföringen är vattentunn bör röret fyllas till hälften.
2. Sätt på locket och skruva igen så att det sluter tätt.
3. Märk provtagningsburken med BoS-etikett.
4. Ange korrekt provtagningstid (datum och klockslag) i Cosmic alt. medsänd provtagningshuvudet med korrekt provtagningstid när provet skickas till laboratoriet.
5. Om flera prov ska lämnas upprepa provtagningen vid nästa tarmtömning och gör likadant med den andra burken
6. Lämna in provtagningsburk/arna till laboratoriet snarast, dock senast inom 3 dagar efter provet tagits. Prov/en ska förvaras i kyla.