

Val av skyddsutrustning vid misstänkt / konstaterad Covid-19

Vårdsituation / Omvårdnad

Skydds- utrustning	Avstånd mer än 2 meter Till exempel: • Samtal	Ingen risk för kontakt med kroppsvätskor Till exempel: • Av- och påklädning • Bädda säng • Kontrollera blodtryck och puls	Risk för kontakt med kroppsvätskor samt vid stickande och skärande moment Till exempel: • Blodprov • Bädda säng • Personlig hygien • Provtagning övre luftvägar • Såromläggning	En stor del av arbetsdräkten kommer i kontakt med patient / brukare och dennes säng Till exempel: • Helkroppsskötning • Fysioterapi Kraftig utsöndring av kroppsvätskor Till exempel: • Diarré • Kraftig hosta • Kräkningar	Smittförande aerosolgenererande procedurer Till exempel: • BIPAP, CPAP • HLR • Sugning av luftvägar utan slutet sugsystem • Trakeostomivård
Basala hygienrutiner	JA	JA	JA	JA	JA
Plastförkläde utan ärm	NEJ	JA	JA	NEJ	NEJ
Plastförkläde med lång ärm	NEJ	NEJ	NEJ	JA	JA
Stänkskydd: visir / skyddsglasögon	NEJ	JA	JA	JA	JA
Stänkskydd: munskydd klass IIR, klass II	NEJ	JA **	JA **	JA **	NEJ
Andningsskydd FFP2, FFP3	NEJ	NEJ **	NEJ **	NEJ **	JA
Skyddshandskar	NEJ	NEJ	JA	JA / NEJ *	JA / NEJ *



** Andningsskydd ersätter munskydd under de sju första dagarna med symtom vid bekräftad covid-19 om den sammanlagda arbetstiden nära brukaren är mer än en timme under ett arbetspass.

* Handskar ska endast användas vid kontakt med kroppsvätskor eller stickande och skärande moment.