



	<b>Påstående</b>	<b>Sant</b>	<b>Falskt</b>
1.	Redan vid första misstanke om smittsam magsjuka ska vårdhygien kontaktas.	<b>X</b>	
2.	Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret		<b>X</b>
3	Även vid intagningsstopp ska man försöka bedriva kohortvård	<b>X</b>	
4	Kohortpersonal ska inte vistas i patientköket.	<b>X</b>	
5.	Städningen har ingen betydelse för smittspridningen		<b>X</b>
6.	För att insjukna måste smittämnet passera munnen	<b>X</b>	
7.	Vinterkräksjukan smittar via luften så alla borde bära munskydd		<b>X</b>
8.	Handsprit är tillräckligt för att avdöda magsjukesvirus		<b>X</b>
9.	Ett negativt provsvar utesluter vinterkräksjukan		<b>X</b>
10.	Rätt mathantering på avdelningen har en avgörande betydelse för smittspridning	<b>X</b>	
11.	Inom kohorten måste man använda handskar och plastförkläde i alla situationer		<b>X</b>
12.	Det är viktigt att invänta provsvar så man inte isolerar patient i onödan		<b>X</b>
13.	Långärmat plastförkläde kan skydda mot stänk vid vård av patient med kräkningar och diarré	<b>X</b>	
14.	Personal som haft vinterkräksjukan får inte återgå i tjänst förrän efter 48 timmar efter sista symtom		<b>X</b>
15.	Vårdplanering kan utföras på avdelning med magsjuka	<b>X</b>	
16.	Munskydd kan behövas vid nära omvårdnad av patient med pågående kräkningar och diarré	<b>X</b>	
17.	Patient som delat toalett med magsjuk patient kan när som helst skrivas ut till hemmet	<b>X</b>	
18.	Patient som genomgått magsjuka kan flytta till annan vårdenheter efter 24 timmars symtomfrihet	<b>X</b>	