



## Smittsam magsjuka sjukvård

|     | <b>Påstående</b>  | <b>Sant</b> | <b>Falskt</b> |
|-----|---|-------------|---------------|
| 1.  | Redan vid första misstanke om smittsam magsjuka ska vårdhygien kontaktas.                             |             |               |
| 2.  | Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret  |             |               |
| 3.  | Även vid intagningsstopp ska man försöka bedriva kohortvård   |             |               |
| 4.  | Kohortpersonal ska inte vistas i patientköket.  |             |               |
| 5.  | Städningen har ingen betydelse för smittspridningen   |             |               |
| 6.  | För att insjukna måste smittämnet passera munnen  |             |               |
| 7.  | Vinterkräksjukan smittar via luften så alla borde bära munskydd                                       |             |               |
| 8.  | Handsprit är tillräckligt för att avdöda magsjukevirus  |             |               |
| 9.  | Ett negativt provsvar utesluter vinterkräksjukan  |             |               |
| 10. | Rätt mathantering på avdelningen har en avgörande betydelse för smittspridning                        |             |               |
| 11. | Inom kohorten måste man använda handskar och plastförkläde i alla situationer                         |             |               |
| 12. | Det är viktigt att invänta provsvar så man inte isolerar patient i onödan                             |             |               |
| 13. | Långärmat plastförkläde kan skydda mot stänk vid vård av patient med kräkningar och diarré            |             |               |
| 14. | Personal som haft vinterkräksjukan får inte återgå i tjänst förrän efter 48 timmar efter sista symtom |             |               |
| 15. | Vårdplanering kan utföras på avdelning med magsjuka   |             |               |
| 16. | Munskydd kan behövas vid nära omvårdnad av patient med pågående kräkningar och diarré                 |             |               |
| 17. | Patient som delat toalett med magsjuk patient kan när som helst skrivas ut till hemmet                |             |               |